

レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報
				薬品名：数量 投与日
MEC【腸】FOLFOX(85-400-2400) 1+ ^Λ クテ化 ^Λ ツカス(6)1 q2w		1	13	5 - F U注:2400mg /m ² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL) 「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 ベクテビックス点滴静注 (100mg5mL):6m g /Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリ-) :1 S T Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 グラニセトロン点滴静注 ^Λ ツカ (1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g /m ² Day1 ブドウ糖注 (5%250mL):1本 Day1 エルプラット点滴静注:85m g /m ² Day1 5 - F U注:400m g /m ² Day1 生食 (50mL):1本 Day1
MEC【腸】FOLFIRI(150-400-2400)1+ ^Λ クテ化 ^Λ ツカス(6)1 q2w		1	13	5 - F U注:2400mg /m ² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL) 「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 ベクテビックス点滴静注 (100mg5mL):6m g /Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリ-) :1 S T Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 カンプト点滴静注:150m g /m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g /m ² Day1 5 - F U注:400m g /m ² Day1 生食 (50mL):1本 Day1
MEC【腸】FOLFIRI(150-400-2400) 1+Bv(5)1 q2w		1	13	5 - F U注:2400mg /m ² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL) 「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 カンプト点滴静注:150m g /m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g /m ² Day1 5 - F U注:400m g /m ² Day1 生食 (50mL):1本 Day1 アバチン注:5m g /Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1
MEC【腸】FOLFIRI(150-400-2400) 1 q2w		1	13	5 - F U注:2400mg /m ² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL) 「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 カンプト点滴静注:150m g /m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g /m ² Day1 5 - F U注:400m g /m ² Day1 生食 (50mL):1本 Day1
【睪】GEM(1000)1.8 q3w		8	13	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注 ^Λ ツカ (1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 Day8 ジェムザール注:1000m g /m ² Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8

【胃】weeklyPTX(80)1.8.15 q4w		15	13	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 バクテリセル注:80mg/g/m ² Day1 Day8 Day15 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 【バクテリセル専用ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 Day15 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トーフ」:1A Day1 Day8 Day15
【腸】ヘクティックス(6)単独1 q2w		1	13	ボラミン注 (5mg1mL):1A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ベクティックス点滴静注 (100mg5mL):6mg/g/Kg Day1 【フィルター付ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
MEC【腸】FOLFIRI+セキナブ(250)1.8 q2w【2回目〜】		8	6	5-FU注:2400mg/g/m ² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL) 「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 ボラミン注 (5mg1mL):1A Day1 Day8 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 カンプト点滴静注:150mg/g/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m ² Day1 5-FU注:400mg/g/m ² Day1 生食 (50mL):1本 Day1 アーピタックス注 (100mg20mL) 【冷】:250mg/g/m ² Day1 Day8 生食(点滴) (500mL):1本 Day1
MEC【腸】セキナブ(250)+CPT-11(150)1.15.29 2回目〜		43	6	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 カンプト点滴静注:150mg/g/m ² Day1 Day15 Day29 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day15 Day29 アーピタックス注 (100mg20mL) 【冷】:250mg/g/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day15 Day29 ボラミン注 (5mg1mL):1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day15 Day29 生食 (250mL):1袋 Day8 Day22 Day36 Day43 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day8 Day22 Day36 Day43
MEC【胃】CPT-11(A法:100)1.8.15 q4w		15	13	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 カンプト点滴静注:100mg/g/m ² Day1 Day8 Day15 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 Day15 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15
【胆】GEM(1000)1.8.15 q4w		15	13	デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000mg/g/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 Day15
【胆】GEM(1000)1.8 q3w		8	13	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 Day8 ジェムザール注:1000mg/g/m ² Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8

【食道】weeklyPTX(B法100)1.8.15.22.29.36 q8w		36	20	<p>パクリタキセル注:100mg/g/m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 【バクテリウム専用ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トーフ」:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p>
MEC【腸】FOLFIRI(150-400-2400) 1+ラムシルマ [®] (8)1 q2w		1	13	<p>5-FU注:2400mg/g/m² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL) 「モチダ」:2mL Day1 生食 (200mL):1本 Day1 サイラムザ点滴静注:8mg/g/Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 カンプト点滴静注:150mg/g/m² Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m² Day1 5-FU注:400mg/g/m² Day1</p>
【胃】weeklyPTX(80)1.8.15+ラムシルマ [®] (8)1.15 q4w		15	13	<p>サイラムザ点滴静注:8mg/g/Kg Day1 Day15 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 Day15 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トーフ」:1A Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80mg/g/m² Day1 Day8 Day15 生食 (50mL):1本 Day1 Day15 【バクテリウム専用ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day8</p>
【胃】ラムシルマ [®] (8)1 q2w		1	13	<p>生食 (100mL):1本 Day1 サイラムザ点滴静注:8mg/g/Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>
HEC限【食道+RT】DCF q8w(用量は別参照)	★新規で使用する際は化学療法委員長に連絡を★DOC(60)1,29+CDDP (60) 1,29+5-FU (600) 1-5,29-33	33	23	<p>生食〔点滴〕 (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day29 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5%20mL) :1本 Day1 Day29 フロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1A Day1 Day29 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day29 ドセタキセル点滴静注:60mg/g/m² Day1 Day29 5-FU注:600mg/g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day29 Day30 Day31 Day32 Day33 シスプラチン注:60mg/g/m² Day1 Day29 生食〔点滴〕 (500mL):300mL Day1 Day29 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day2 Day3 Day30 Day31</p>

HEC限【食道】DOC(40)1.15+5Fu(800)1-5+CDDP(80)1 q4w		15	<p>13</p> <p>フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1A Day1 生食(50mL):1本 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注(3.3mg1mL):3A Day1 ドセタキセル点滴静注:40mg/m² Day1 Day15 生食(点滴)(500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day15 5-FU注:800mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム3A輸液(500mL):1本 Day1 シスプラチン注:80mg/m² Day1 生食(点滴)(500mL):300mL Day1 ◆硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL(20mL):8mL Day1 デキサート注(3.3mg1mL):2A Day2 Day3 Day15 生食(100mL):1本 Day15</p>
HEC【腸】FOLFOXIRI(85-165-3200)+BV(5) q2w	【内服処方】イモドセト、デカトロン day2-day4、【検査】UGT1A1遺伝子多型(推奨)	1	<p>13</p> <p>デキサート注(3.3mg1mL):3A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 5-FU注:3200mg/m² Day1 ◆ヘパリンNa注(5000単位5mL)「モチダ」:2mL Day1 生食(200mL):1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m² Day1 ブドウ糖注(5%250mL):1本 Day1 アバスチン注:5mg/Kg Day1 生食(100mL):1本 Day1 カンプト点滴静注:165mg/m² Day1 生食(250mL):1袋 Day1 エルプラット点滴静注:85mg/m² Day1</p>
MEC 限定【腸】TAS-102+BV(5)1.15 q4w	【内服処方】TAS-102(35mg/m ² /回) 1日2回 day1~5, day8~12, Steroid sparingレジメン	15	<p>13</p> <p>パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注(3.3mg1mL):3A Day1 アバスチン注:5mg/Kg Day1 Day15 生食(100mL):1本 Day1 Day15 生食(50mL):1本 Day15</p>
MEC【腸】SIRB:S-1+CPT-11(150)1+BV(7.5)1 q3w	【内服処方】S-1 14日間 (day1 夕食後~day15 朝食後)	1	<p>20</p> <p>デキサート注(3.3mg1mL):3A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 生食(100mL):1本 Day1 アバスチン注:7.5mg/Kg Day1 カンプト点滴静注:150mg/m² Day1 生食(点滴)(500mL):1本 Day1</p>
HEC【食道+RT併用】5Fu(700)1~4+CDDP(70)1 q4w	【RT併用】	4	<p>24</p> <p>パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注(3.3mg1mL):3A Day1 5-FU注:700mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 生食(点滴)(500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム3A輸液(500mL):1本 Day1 ◆硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL(20mL):8mL Day1 フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1A Day1 生食(50mL):1本 Day1 シスプラチン注:70mg/m² Day1 生食(点滴)(500mL):300mL Day1 デキサート注(3.3mg1mL):2A Day2 Day3</p>

HEC【食道】5Fu(800)1~5+CDDP(80)1 q4w		5	23	シスプラチン注:80m g/m ² Day1 生食(点滴)(500mL):300m L Day1 ソルデム3 A 輸液(500mL):1本 Day1 ◆硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL(20mL):8m L Day1 5-FU注:800m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食(点滴)(500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注(3.3mg1mL):3A Day1 プロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1A Day1 生食(50mL):1本 Day1 デキサート注(3.3mg1mL):2A Day2 Day3
【腸】CAP(1000)1-14+BV(7.5)1 q3w	ゼローダは1回1000mg/m ² 1日2回内服	1	20	生食(50mL):1本 Day1 生食(100mL):1本 Day1 アバスチン注:7.5m g/Kg Day1
MEC【腸】ヘキセチックス(6)1+CPT-11(150)1 q2w		1	13	ベクテイビックス点滴静注(100mg5mL):6m g/Kg Day1 生食(100mL):1本 Day1 【フィルター付】輸液セット(PVCフリー):1S T Day1 カンプト点滴静注:150m g/m ² Day1 生食(点滴)(500mL):1本 Day1 デキサート注(3.3mg1mL):3A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1
【腸】セツキシマブ単独(400)1 q1w【初回】		1	6	ボラミン注(5mg1mL):1A Day1 デキサート注(3.3mg1mL):2A Day1 生食(100mL):1本 Day1 アーピタックス注(100mg20mL)【冷】:400m g/m ² Day1 生食(250mL):1袋 Day1
【腸】セツキシマブ単独(250)1 q1w【2回目〜】		1	6	ボラミン注(5mg1mL):1A Day1 デキサート注(3.3mg1mL):2A Day1 生食(100mL):1本 Day1 アーピタックス注(100mg20mL)【冷】:250m g/m ² Day1 生食(250mL):1袋 Day1
【胃】ニボルマブ(240mg/body)1 q2w		1	13	生食(50mL):1本 Day1 生食(100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:240m g Day1 【フィルター付】輸液セット(PVCフリー):1S T Day1
【腸】UFT/LV+BV(5)1.15 q4w	【内服処方】UFT 300mg/m ² 、LV 75mg day1-day21(強力な治療の適応とならない症例用)	15	13	生食(50mL):1本 Day1 Day15 生食(100mL):1本 Day1 Day15 アバスチン注:5m g/Kg Day1 Day15

HEC【薛】FOLFIRINOX(400-2400-180-85) 1 q2w	イメド、day2-day4 7*カ`0、UGT1A1遺伝子多型検査推奨	1	13	5-F U注:2400mg/g/m ² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL)「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 エルプラット点滴静注:85mg/g/m ² Day1 ブドウ糖注 (5%250mL):1本 Day1 カンプト点滴静注:180mg/g/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m ² Day1 5-F U注:400mg/g/m ² Day1 生食 (50mL):1本 Day1
【胃】DOC(40)1+S-1 q3w【Adj】	1J-S: S-1単独(2投1休)、2-7J-S: DOC+S-1(2投1休)、8J-S以降: S-1単独(4投2休or2投1休) 手術1年後まで繰り返す	1	20	デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ドセタキセル点滴静注:40mg/g/m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1
MEC【腸】FOLFIRI(150-400-2400)1+アリアレルセプト(4)1 q2w		1	13	カンプト点滴静注:150mg/g/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m ² Day1 ザルトラップ点滴静注:4mg/Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 5-F U注:400mg/g/m ² Day1 生食 (50mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 5-F U注:2400mg/g/m ² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL)「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1
【食道】ニボルマブ(240mg/body)1 q2w		1	13	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:240mg Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
MEC【薛】nal-IRI(70)1+5Fu(2400)/I-LV(200)1 q2w	UGT1A1*6若しくは*28のホモ又は*6及び*28のヘテロはイリリテカとして50mg/m ² で開始。忍容性あれば70mg/m ² に増量可。	1	13	デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 ◆オニバイド点滴静注 (43mg10mL)【冷】:70mg/g/m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 5-F U注:2400mg/g/m ² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL)「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1
MEC【胃】FOLFOX(85-400-2400) 1 q2w		1	13	デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ(1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 エルプラット点滴静注:85mg/g/m ² Day1 ブドウ糖注 (5%250mL):1本 Day1 5-F U注:400mg/g/m ² Day1 生食 (50mL):1本 Day1 5-F U注:2400mg/g/m ² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL)「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m ² Day1

MEC【降】GEM(1000)1.8+TS-1day1~14 q3w		8	13	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 ジェムザール注:1000m g /m Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 グラニセトン点滴静注 ^ハ ツカ ^〆 (1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 Day8
HEC SH【胆】CDDP(25)1+GEM(1000)1+TS-1day1~7 q2w	【内服処方】イメンドカプセルセット : day1	1	13	ジェムザール注:1000m g /m Day1 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5% E 20mL) :8m L Day1 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 シスプラチン注:25m g /m Day1 生食〔点滴〕 (500mL):300m L Day1 フロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1 A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 グラニセトン点滴静注 ^ハ ツカ ^〆 (1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1
MEC【胆】CDDP(25)1.8+GEM(1000)1.8 q3w		10	11	硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5% E 20mL) :8m L Day1 Day8 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 Day8 グラニセトン点滴静注 ^ハ ツカ ^〆 (1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 生食〔点滴〕 (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day8 Day9 Day10 ジェムザール注:1000m g /m Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 フロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1 A Day1 Day8 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 シスプラチン注:25m g /m Day1 Day8 生食〔点滴〕 (500mL):300m L Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day2 Day3 Day9 Day10 生食 (100mL):1本 Day2 Day3 Day9 Day10
MEC SH【胆】CDDP(25)1.8+GEM(1000)1.8 q3w		8	13	シスプラチン注:25m g /m Day1 Day8 生食〔点滴〕 (500mL):300m L Day1 Day8 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 Day8 グラニセトン点滴静注 ^ハ ツカ ^〆 (1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 フロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1 A Day1 Day8 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 ジェムザール注:1000m g /m Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5% E 20mL) :8m L Day1 Day8
MEC【降】nab-PTX(125)1.8.15+GEM(1000)1.8.15 q4w	ア ^〆 ラキサンは血液製剤の登録が必要です！！	15	13	(毒)アブラキサン点滴静注 (100mg):125m g /m Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000m g /m Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 Day15 グラニセトン点滴静注 ^ハ ツカ ^〆 (1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15
MEC【食道】CDGP(80)1+DOC(60)1 q3w		1	20	ドセタキセル点滴静注:60m g /m Day1 生食〔点滴〕 (500mL):1本 Day1 アクブラ静注用:80m g /m Day1 フロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1 A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 グラニセトン点滴静注 ^ハ ツカ ^〆 (1mg50mL)「HK」:1袋 Day1

MEC【食道】CDGP(90)1+5Fu(800)1~5 q4w		6	22	<p>デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 グラニセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] (1mg50mL)〔HK〕:1袋 Day1 フロセミド注(20mg2mL)〔NIG〕:1A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5 – F U注:800m g /m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アクブラ静注用:90m g /m² Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (100mL):1本 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6</p>
MEC【小腸】FOLFOX(85-400-2400) 1 q2w		1	13	<p>5 – F U注:2400m g /m² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL)〔モチダ〕:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85m g /m² Day1 ブドウ糖注 (5%250mL):1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g /m² Day1 5 – F U注:400m g /m² Day1 生食 (50mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 グラニセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] (1mg50mL)〔HK〕:1袋 Day1</p>
MEC【腸】CapeOX(130)1+Bv(7.5)1 q3w	ゼローダ 1回1000mg/m ² 1日2回 day1 夕食後~day15 朝食後	1	20	<p>生食 (100mL):1本 Day1 アバスチン注:7.5m g /Kg Day1 エルプラット点滴静注:130m g /m² Day1 ブドウ糖注 (5%500mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 グラニセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] (1mg50mL)〔HK〕:1袋 Day1</p>
MEC【腸】FOLFOX(85-400-2400) 1 q2w		1	13	<p>5 – F U注:2400m g /m² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL)〔モチダ〕:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g /m² Day1 ブドウ糖注 (5%250mL):1本 Day1 エルプラット点滴静注:85m g /m² Day1 5 – F U注:400m g /m² Day1 生食 (50mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 グラニセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] (1mg50mL)〔HK〕:1袋 Day1</p>
MEC【腸】FOLFOX(85-400-2400) 1+Bv(5)1 q2w		1	13	<p>5 – F U注:2400m g /m² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL)〔モチダ〕:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g /m² Day1 ブドウ糖注 (5%250mL):1本 Day1 エルプラット点滴静注:85m g /m² Day1 アバスチン注:5m g /Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1 5 – F U注:400m g /m² Day1 生食 (50mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 グラニセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] (1mg50mL)〔HK〕:1袋 Day1</p>
MEC限定【臍】nab-PTX(125)1.8+GEM(1000)1.8 q3w	ア [®] ナ [®] は血液製剤の登録が必要です！！	8	13	<p>生食 (100mL):1本 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] (1mg50mL)〔HK〕:1袋 Day1 Day8 (毒)アブラキサン点滴静注 (100mg):125m g /m² Day1 Day8 ジェムザール注:1000m g /m² Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8</p>

MEC 限定【胃】トラスズマブ デルカカ(6.4)1 q3w		1	20	◆エンハーツ点滴静注用(100mg)【冷】:6.4mg /Kg Day1 注射用水 (100mL):1本 Day1 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロセトロン点滴静注/バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 ブドウ糖注 (5%50mL):1本 Day1
【胃】ニボルマブ(480mg/body)1 q4w		1	27	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:480mg Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
【食道】ニボルマブ(480mg/body)1 q4w		1	27	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:480mg Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
【肝】アテゾリスマブ(1200)1+BV(15)1 q3w		1	20	生食 (50mL):1本 Day1 ◆テセントリク点滴静注(1200mg20mL)【冷】:1200mg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 アバスチン注:15mg /Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1
【胃】nab-PTX(PTX : 100)1.8.15 q4w	アブラキサンは血液製剤の登録が必要です！！	15	13	デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 (毒)アブラキサン点滴静注 (100mg):100mg /m ² Day1 Day8 Day15
【胃】nab-PTX(PTX : 100)1.8.15+ラムシルマブ(8)1.15 q4w	アブラキサンは血液製剤の登録が必要です！！ ★day15のnab-PTXをskipしても休業期間は短縮しない★	15	13	生食 (50mL):1本 Day1 Day8 Day15 (毒)◆アブラキサン点滴静注 (100mg):100mg /m ² Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注:8mg /Kg Day1 Day15 生食 (250mL):1袋 Day1 Day15 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day15
【腸】エンラフィニブ +セキサート (250)1 q1w【2回目〜】	エンラフィニブ 1回300mg1日1回	1	6	ボラミン注 (5mg1mL):1A Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 アーピタックス注 (100mg20mL) 【冷】:250mg /m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1
【食道】ニボルマブ(360)1.22+パドマブ(1)1 q6w	最長24ヵ月継続	22	20	生食 (100mL):1本 Day1 Day22 生食 (50mL):1本 Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注用:1mg /Kg Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:360mg Day1 Day22 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day22
MEC【腸】CapeOX(130)1 q3w	ゼローダ 1回1000mg/m ² 1日2回 day1 夕食後~day15 朝食後	1	20	生食 (100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 グラニセトロン点滴静注「バッグ」(1mg50mL)「HKJ」:1袋 Day1 エルプラット点滴静注:130mg /m ² Day1 ブドウ糖注 (5%500mL):1本 Day1 【閉鎖式】輸液セット (DEHPフリー) :1 S T Day1

【腸】ヘムプロシズマブ (200mg/body)1 q3w	治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌の一次治療。	1	20 生食 (50mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):200m g Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 生食 (100mL):1本 Day1
【腸】エンコラフェニブ +セツチマブ (500)1 q2w	エンコラフェニブ 1回300mg1日1回	1	13 アービタックス注 (100mg20mL) 【冷】:500m g/m Day1 生食 (点滴) (500mL):300m L Day1 ボララミン注 (5mg1mL):1A Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 生食 (100mL):1本 Day1
MEC【胃】ニホルマブ (360mg/body)1+SOX (130) 1 q3w	TS-1(80mg/m) day1夕食後~day15朝食後	1	20 生食 (50mL):1本 Day1 オブジーボ点滴静注:360m g Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m Day1 ブドウ糖注 (5%500mL):1本 Day1
HEC【食道】5Fu(800)+CDDP(80)+ ¹²⁵ Iラジウム q3w	¹²⁵ Iラジウム 及び5Fu投与は最大35サイクル、CDDP投与は最大6サイクル【内服処方】イメドカプセルセット : day1	6	15 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 パノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 プロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1A Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5%#20mL) :8m L Day1 生食 (点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン注:80m g/m Day1 生食 (点滴) (500mL):300m L Day1 5 - F U 注:800m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (100mL):1本 Day6
HEC【肺】mFOLFIRINOX(2400-150-85) 1 q2w	アプビタクト、day2-day4 テカト、UGT1A1遺伝子多型検査推奨	1	13 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 エルプラット点滴静注:85m g/m Day1 ブドウ糖注 (5%250mL):1本 Day1 カンプト点滴静注:150m g/m Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 5 - F U 注:2400m g/m Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL) 「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m Day1
【BS】MEC【腸】CapeOX(130)1+BV(7.5)1 q3w	ゼローダ 1回1000mg/m2 1日2回 day1 夕食後~day15 朝食後	1	20 生食 (100mL):1本 Day1 エルプラット点滴静注:130m g/m Day1 ブドウ糖注 (5%500mL):1本 Day1 ペバシズマブBS点滴静注:7.5m g/Kg Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 グラセトロン点滴静注バッグ (1mg50mL)「HK」:1袋 Day1

MEC【胃】SOX(130)1+HER(6)1 q3w【2回目以降】	【内服処方】S-1 80mg/m ² /日 day1~14	1	20	<p>デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 エルブラット点滴静注:130m g/m² Day1 ブドウ糖注 (5%500mL):1本 Day1 ハーセプチン注:6m g /Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL):2本 Day1</p>
MEC【胃】SOX(130)1+HER(8)1 q3w【初回】	【内服処方】S-1 80mg/m ² /日 day1~14	1	20	<p>デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 エルブラット点滴静注:130m g/m² Day1 ブドウ糖注 (5%500mL):1本 Day1 ハーセプチン注:8m g /Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL):2本 Day1</p>
MEC【腸】FOLFIRI+セツキシマブ [®] (500)1 q2w		1	13	<p>デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 ボラミン注 (5mg1mL):1A Day1 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 アーピタックス注 (100mg20mL) 【冷】:500m g/m² Day1 生食〔点滴〕 (500mL):300m L Day1 生食 (100mL):1本 Day1 カンプト点滴静注:150m g/m² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 S – F U注:400m g/m² Day1 生食 (50mL):1本 Day1 S – F U注:2400m g/m² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL) 「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m² Day1</p>
MEC【腸】FOLFOX+セツキシマブ [®] (500)1 q2w		1	13	<p>デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 ボラミン注 (5mg1mL):1A Day1 グラセトロン点滴静注「ツガ」 (1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 アーピタックス注 (100mg20mL) 【冷】:500m g/m² Day1 生食〔点滴〕 (500mL):300m L Day1 生食 (100mL):1本 Day1 エルブラット点滴静注:85m g/m² Day1 ブドウ糖注 (5%250mL):1本 Day1 S – F U注:400m g/m² Day1 生食 (50mL):1本 Day1 S – F U注:2400m g/m² Day1 ◆ヘパリンNa注 (5000単位5mL) 「モチダ」:2m L Day1 生食 (200mL):1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m² Day1</p>
【腸】セツキシマブ単独 (500) 1 q2w		1	13	<p>ボラミン注 (5mg1mL):1A Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 アーピタックス注 (100mg20mL) 【冷】:500m g/m² Day1 生食〔点滴〕 (500mL):300m L Day1</p>

限定【胃】HER (6) 1 q3w	※前回投与から4週未満の場合はこちらのレジメンを使用してください	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ハーセプチン注:6mg /Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL):2本 Day1
MEC SH【胆】テ`ニルバ`ルマ` + CDDP+GEM q3w(BW30kg超)	8サイクル終了後、維持療法へ移行。	8	13	イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注`ツガ` (1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 Day8 ジェムザール注:1000mg /m ² Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 Day8 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5%#20mL) :8m L Day1 Day8 フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1A Day1 Day8 シスプラチン注:25mg /m ² Day1 Day8 生食(点滴) (500mL):300m L Day1 Day8
【胆】テ`ニルバ`ルマ` (1500mg/body)1 q4w(BW30kg超)	テ`ニルバ`ルマ` + CDDP+GEM 8サイクル後の維持療法。	1	27	生食 (50mL):1本 Day1 イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 生食 (100mL):1本 Day1
【BS】MEC【胃】SOX(130)1+HER(8)1 q3w【初回】	【内服処方】S-1 80mg/m ² /日 day1~14	1	20	デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロノセロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 エルプラット点滴静注:130mg /m ² Day1 ブドウ糖注 (5%500mL):1本 Day1 トラスツズマブ点滴静注:8mg /Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL):2本 Day1
MEC【胃】SOX (100) 1 q3w (低用量)	TS-1(80mg/m ²) day1 夕食後~day15 朝食後	1	20	生食 (100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロノセロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 エルプラット点滴静注:100mg /m ² Day1 ブドウ糖注 (5%500mL):1本 Day1 【閉鎖式】輸液セット (DEHPフリー) :1 S T Day1