

レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報
				薬品名：数量 投与日
【咽頭】DOC(60)1 q4w		1	27	生食 (100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 ドセタキセル点滴静注:60mg/m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1
MEC【頭頸部】5Fu1000+CBDC5+ [△] [△] [△] [△] [△] q3w	プラチナ製剤及び5FUは最大6サイクル投与【内服処方】イメンドカプセルセット：day1	4	17	5-FU注:1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 カルボプラチン注:5AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生食 (50mL):1本 Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1S T Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):1A Day1 パロノセロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 生食 (100mL):1本 Day1
【頭頸部】PTX(80)1+セツキマ [△] (400)1 q1w【初回】		1	6	生食 (100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 ◆アービタックス注 (100mg20mL)【冷】:400mg/m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 バクリタキセル注:80mg/m ² Day1 生食 (250mL):1本 Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1S T Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1A Day1
【頭頸部】ヘムプロリスマブ (200mg/body)1 q3w	CDDP又はCBDC5+5FU+Pembroを最大6回施行後の維持療法にも使用	1	20	◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):200mg Day1 生食 (50mL):1本 Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1S T Day1 生食 (100mL):1本 Day1
HEC【頭頸部】5Fu1000+CDDP100+ [△] [△] [△] [△] [△] q3w	プラチナ製剤及び5FUは最大6サイクル投与【内服処方】イメンドカプセルセット：day1	4	17	ソルデム3A輸液 (500mL):1本 Day1 5-FU注:1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 シスプラチン注:100mg/m ² Day1 生食(点滴) (500mL):300mL Day1 パロノセロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1S T Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5tL/20mL) :8mL Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day2 Day3 Day4

【頭頸部】PTX(80)1+セツキマ [®] (250)1 q1w[2回目~]		1	生食 (100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 ◆アービタックス注 (100mg20mL)【冷】:250m g /m ³ Day1 生食 (250mL):1本 Day1 パクリタキセル注:80m g /m ³ Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1 A Day1
【頭頸部+RT併用】BRT : セツキマ [®] 1.8.15.22.29.36.43	初回400mg/m ³ 、2回目以降250mg/m ³	43	アービタックス注 (100mg20mL)【冷】:400m g /m ³ Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 ボラミン注 (5mg1mL):1 A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 アービタックス注 (100mg20mL)【冷】:250m g /m ³ Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生食 (250mL):1袋 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43
HEC【頭頸部+RT併用】CDDP(100) 1 q3w		3	生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5%#20mL) :8m L Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 シスプラチン注:100m g /m ³ Day1 生食(点滴) (500mL):300m L Day1 フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1 A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day2 Day3 生食 (100mL):1本 Day2 Day3
HEC【頭頸部】DOC(60)1+5Fu(700)1~4+CDDP(60)1 c		4	シスプラチン注:60m g /m ³ Day1 生食(点滴) (500mL):300m L Day1 ドセタキセル点滴静注:60m g /m ³ Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5%#20mL) :8m L Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 5 - F U注:700m g /m ³ Day1 Day2 Day3 Day4 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1 A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day2 Day3
【頭頸部】ニボルマブ(240mg/body)1 q2w		1	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オブジーボ点滴静注:240m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1

MEC【頭頸部】PTX100+CBDC2.5+セキシマ [®] q3w【初回】	アビタックスは1回目400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ²	15	6	<p>デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 Day8 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トーフ」:1A Day1 Day8 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注:100m g /m² Day1 Day8 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day8 ◆アビタックス注 (100mg20mL) 【冷】:400m g /m² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 カルボプラチン注:2.5AUC/m² Day1 Day8 アビタックス注 (100mg20mL) 【冷】:250m g /m² Day8 ボラミン注 (5mg1mL):1A Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day15 ◆アビタックス注 (100mg20mL) 【冷】:250m g /m² Day15</p>
限定【頭頸部】セツキシマ [®] 単剤 (250) 1 q1w	※併用療法ができない場合のみ	1	6	<p>ボラミン注 (5mg1mL):1A Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 アビタックス注 (100mg20mL) 【冷】:250m g /m² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1</p>
【頭頸部】ニボルマブ(480mg/body)1 q4w		1	27	<p>生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:480m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>
【頭頸部】ペムプロリズマブ (400mg/body)1 q6w		1	41	<p>生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):400m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>
【唾液腺】HER(6mg/kg)1+DOC(70)1【2回目以降】 q3w		1	20	<p>ハーセプチン注:6m g /Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL):2本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ドセタキセル点滴静注:70m g /m² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1</p>

HEC【頭頸部+RT併用】CDDP(40) 1 q1w【Adj】	7サイクル施行	3	<p>シスプラチン注:40m g /m² Day1 生食【点滴】(500mL):300m L Day1 フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1A Day1 生食(50mL):1本 Day1 ソルデム3 A輸液(500mL):1本 Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL(0.5E#20mL) :8m L Day1 生食【点滴】(500mL):1本 Day1 Day2 Day3 アロカリス点滴静注(235mg10mL)【冷】:1V Day1 グラニセトロン点滴静注「ハック」(1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 デキサート注(3.3mg1mL):3A Day1 デキサート注(3.3mg1mL):2A Day2 Day3 生食(100mL):1本 Day2 Day3</p>
【唾液腺】HER(8mg/kg)1+DOC(70)1【初回】 q3w		1	<p>ハーセプチン注:8m g /Kg Day1 生食(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL):2本 Day1 デキサート注(3.3mg1mL):2A Day1 生食(100mL):1本 Day1 ドセタキセル点滴静注:70m g /m² Day1 生食【点滴】(500mL):1本 Day1</p>