

レジメン名	コメント	投与 休薬		薬剤情報
		日数	期間	薬品名：数量 投与日
【乳】weeklyPTX(90)1.8.15+BV(10)1.15 q4w		15	13	バクリタキセル注:90mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 【バクリタキセル専用ルート】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 Day8 Day15 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トーフ」:1 A Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 アバスチン注:10mg/Kg Day1 Day15
【乳】Hala(1.4)1.8 q3w		8	13	デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 Day8 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 ハラヴェン静注 (1mg2mL):1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食 (50mL):1本 Day1 Day8
【乳】DOC(75)1 q3w		1	20	デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ドセタキセル点滴静注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1
【乳】VNR(25)1.8 q3w		8	13	生食 (50mL):1本 Day1 Day8 ナベルピン注:25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食 (100mL):1本 Day1 Day8
【乳】GEM(1250)1.8 q3w		8	13	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 Day8 ジェムザール注:1250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8
MEC 限定【乳】トラスツマブ デルスタカ(5.4)1 q3w		1	20	デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 ブドウ糖注 (5%50mL):1本 Day1 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 ◆エンハーツ点滴静注用(100mg)【冷】:5.4mg/Kg Day1 注射用水 (100mL):1本 Day1 【フィルター付ルート】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1
【乳】nab-PTX(PTX : 260)1+BV(15)1 q3w	アブラキサンは血液製剤の登録が必要です！！	1	20	デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 (毒)アブラキサン点滴静注 (100mg):260mg/m <sup>2</sup> Day1 アバスチン注:15mg/Kg Day1

MEC【乳】 $\Lambda^{\circ}$ $\Delta^{\circ}$ $\Gamma^{\circ}$ $\Sigma^{\circ}$ 1+CBDC1.8+GEM1.8 q3w	CPS < 10の患者に対する有効性は確立していない。 $\Lambda^{\circ}$ $\Delta^{\circ}$ $\Gamma^{\circ}$ $\Sigma^{\circ}$ は最大35回投与。	8	13	<p>ジエムザール注:1000mg /m<sup>2</sup> Day1 Day8          ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8          生食 (100mL):1本 Day1 Day8          カルボプラチン注:2AUC/m<sup>2</sup> Day1 Day8          生食 (250mL):1袋 Day1 Day8          生食 (50mL):1本 Day1          デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 Day8          パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day8          キイトルーダ点滴静注:200mg Day1          【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>
【乳】PER(840)1+HER(8)1+PTX(80)1.8.15 q3w【初回】		15	6	<p>ハーセプチン注:8mg /Kg Day1          生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15          注射用水 (20mL):2本 Day1          バクリタキセル注:80mg /m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15          【<math>\Lambda^{\circ}</math> <math>\Delta^{\circ}</math> <math>\Gamma^{\circ}</math> <math>\Sigma^{\circ}</math> 専用ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day8 Day15          生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15          デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 Day15          【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1A Day1 Day8 Day15          パージェタ点滴静注:840mg Day1</p>
【乳】PER(420)1+HER(6)1+DOC(75)1【2回目〜】 q3w		1	20	<p>ドセタキセル点滴静注:75mg /m<sup>2</sup> Day1          生食(点滴) (500mL):1本 Day1          デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1          生食 (100mL):1本 Day1          パージェタ点滴静注:420mg Day1          生食 (250mL):1袋 Day1          ハーセプチン注:6mg /Kg Day1          注射用水 (20mL):2本 Day1</p>
【乳】PER(420)1+HER(6)1+PTX(80)1.8.15q3w【2回目】		15	6	<p>ハーセプチン注:6mg /Kg Day1          生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15          注射用水 (20mL):2本 Day1          バクリタキセル注:80mg /m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15          【<math>\Lambda^{\circ}</math> <math>\Delta^{\circ}</math> <math>\Gamma^{\circ}</math> <math>\Sigma^{\circ}</math> 専用ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day8 Day15          生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15          デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 Day15          【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1A Day1 Day8 Day15          パージェタ点滴静注:420mg Day1</p>
【乳】カドサイラ(3.6)1 q3w		1	20	<p>デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1          生食 (100mL):1本 Day1          カドサイラ点滴静注:3.6mg /Kg Day1          生食 (250mL):1袋 Day1          注射用水 (20mL):1本 Day1          【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>

【乳】PER(840)1+HER(8)1 q3w	術後補助療法の場合はタキサンと併用後	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 パーゼタ点滴静注:840m g Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 ハーセプチン注:8m g /Kg Day1 注射用水 (20mL):2本 Day1
【乳】HER (6mg/kg) 1 q3w 【2回目以降】		1	20	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ハーセプチン注:6m g /Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 注射用水 (20mL):2本 Day1
【乳】PER(420)1+HER(6)1 q3w	術後補助療法の場合はタキサンと併用後	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 パーゼタ点滴静注:420m g Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ハーセプチン注:6m g /Kg Day1 注射用水 (20mL):2本 Day1
【乳】PER(840)1+HER(8)1+DOC(75)1【初回】 q3w		1	20	ドセタキセル点滴静注:75m g /m <sup>2</sup> Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 パーゼタ点滴静注:840m g Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 ハーセプチン注:8m g /Kg Day1 注射用水 (20mL):2本 Day1
HEC【乳】 $\wedge$ $\Delta$ $\circ$ $\square$ $\nabla$ $\circ$ $\Delta$ $\circ$ 1+ADR1+CPA1 q3w【NAC】	トリプルホリゾンタイプ乳がん（再発高リスク）。アプレビタント併用。	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 ドキシルピジン塩酸塩注:60m g /m <sup>2</sup> Day1 生食 (100mL):1本 Day1 エンドキサン注:600m g /m <sup>2</sup> Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【閉鎖式ルト】輸液セット (DEHPフリー) :1 S T Day1

MEC【乳】 $\Lambda^{\circ}$ $\Delta^{\circ}$ $\Gamma^{\circ}$ $\Sigma^{\circ}$ $\Pi^{\circ}$ $\Theta^{\circ}$ $\Upsilon^{\circ}$ $\Phi^{\circ}$ $\Psi^{\circ}$ $\Omega^{\circ}$ 1+CBDC1+PTX1.8.15 q3w【NA	トリ $\alpha$ $\beta$ $\gamma$ $\delta$ $\epsilon$ $\zeta$ $\eta$ $\theta$ $\iota$ $\kappa$ $\lambda$ $\mu$ $\nu$ $\xi$ $\omicron$ $\pi$ $\rho$ $\sigma$ $\tau$ $\upsilon$ $\phi$ $\chi$ $\psi$ $\omega$ 乳がん（再発高リスク）。 $\Lambda^{\circ}$ $\Delta^{\circ}$ $\Gamma^{\circ}$ $\Sigma^{\circ}$ 併用。	15	6 バクリタキセル注:80mg / $\text{m}^2$ Day1 Day8 Day15 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注:5AUC/ $\text{m}^2$ Day1 デキサート注 (3.3mg/1mL):3 A Day1 Day8 Day15 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トーワ」:1 A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注:200mg / $\text{m}^2$ Day1 【フィルタ-付ルト】輸液セット (PVC7リ- ) :1 S T Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg/2mL)「トーワ」:1 A Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day8 Day15 【バクリタキセル専用ルト】輸液セット (PVC7リ- ) :1 S T Day8 Day15
HEC【乳】AC : ADR(60)1+CPA(600)1 q3w		1	20 デキサート注 (3.3mg/1mL):3 A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注:60mg / $\text{m}^2$ Day1 【閉鎖式ルト】輸液セット (DEHP7リ- ) :1 S T Day1 エンドキサン注:600mg / $\text{m}^2$ Day1 生食 (250mL):1袋 Day1
HEC【乳】ddAC : ADR(60)1+CPA(600)1 q2w	4サイクル。 $\Lambda^{\circ}$ $\Delta^{\circ}$ $\Gamma^{\circ}$ $\Sigma^{\circ}$ $\Pi^{\circ}$ $\Theta^{\circ}$ $\Upsilon^{\circ}$ $\Phi^{\circ}$ $\Psi^{\circ}$ $\Omega^{\circ}$ 併用。【内服処方】アプレピタント併用。	1	13 ドキシソルピシン塩酸塩注:60mg / $\text{m}^2$ Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【閉鎖式ルト】輸液セット (DEHP7リ- ) :1 S T Day1 エンドキサン注:600mg / $\text{m}^2$ Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg/1mL):3 A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 生食 (50mL):1本 Day1
MEC【乳】TC : DOC(75)1+CPA(600)1 q3w	術後補助療法4サイクル。【内服処方】デキサメタゾン8mg : day2、3	1	20 デキサート注 (3.3mg/1mL):3 A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ドセタキセル点滴静注:75mg / $\text{m}^2$ Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 【閉鎖式ルト】輸液セット (DEHP7リ- ) :1 S T Day1 エンドキサン注:600mg / $\text{m}^2$ Day1 生食 (250mL):1袋 Day1