

レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報
				薬品名：数量 投与日
【肺SCLC】アテゾリズマブ(1200mg/body)1 q3w		1	20	生食 (50mL):1本 Day1 ◆テセントリク点滴静注(1200mg20mL)[冷]:1200mg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 生食 (100mL):1本 Day1
【肺NSCLC】アテゾリズマブ(1200)1+BV(15)1 q3w	維持療法	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 ◆テセントリク点滴静注(1200mg20mL)[冷]:1200mg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 アバスチン注:15mg/Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1
MEC【肺NSCLC】アテゾリズマブ+CBDCa+PTX+BV q3w	導入療法 (4又は6サイクル)	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 ◆テセントリク点滴静注(1200mg20mL)[冷]:1200mg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 プロイメンド点滴静注用 (150mg):1V Day1 アバスチン注:15mg/Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1 パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1
HEC SH【肺NSCLC+RT併用】CDDP(40)1.8+DOC(40)1.8 q4w	CD療法：【放射線治療】60Gy/30回 (6週) day1～ 地固めなし	8	20	硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5ℓ)20mL :8m L Day1 Day8 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 Day8 フロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1A Day1 Day8 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 シスプラチン注:40mg/m ² Day1 Day8 生食(点滴) (500mL):300m L Day1 Day8 プロイメンド点滴静注用 (150mg):1V Day1 Day8 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注:40mg/m ² Day1 Day8 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day8
限定【肺NSCLC】BV(15)1+カレラ 連日 q3w		1	20	生食 (50mL):1本 Day1 アバスチン注:15mg/Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1
【肺NSCLC】ニボルマブ(240mg/body)1 q2w		1	13	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:240mg Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1

HEC SH【肺NSCLC】 \wedge Δ 7 \wedge \wedge 7 \wedge +CDDP+PEM q3w	【内服処方】デキサメタゾン8 mg : day 2~4	1	20 生食 (50mL):1本 Day1 キイトルータ点滴静注:200mg Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 プロイメド点滴静注用 (150mg)【冷】:1 V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 アリムタ注射用:500mg /m ² Day1 生食 (100mL):1本 Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5% Δ 20mL) :8m L Day1 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 シスプラチン注:75mg /m ² Day1 生食【点滴】 (500mL):300m L Day1 フロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1 A Day1
HEC【肺NSCLC+RT併用】CDDP(40)1.8+DOC(40)1.8 q4w	CD療法 : 【内服処方】イメドカプセルセット : day1、8 【放射線治療】60Gy/30回 (6週) day1~ 地固めなし	10	18 生食【点滴】 (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day8 Day9 Day10 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注:40mg /m ² Day1 Day8 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 Day8 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5% Δ 20mL) :8m L Day1 Day8 フロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1A Day1 Day8 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 シスプラチン注:40mg /m ² Day1 Day8 生食【点滴】 (500mL):300m L Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day2 Day3 Day9 Day10 生食 (100mL):1本 Day2 Day3 Day9 Day10
【肺NSCLC】ヘムプロリスマブ (200mg/body)1 q3w	化学療法未治療患者ではTPS \geq 50%、化学療法既治療患者ではTPS \geq 1%	1	20 生食 (100mL):1本 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 ◆キイトルータ点滴静注(100mg4mL):200mg Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
HEC SH【肺NSCLC】CDDP(80)1+CPT-11(60)1.8.15 q4w	【内服処方】デキサメタゾン8 mg : day 2~4、9~11、16~18	15	13 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 プロイメド点滴静注用 (150mg)【冷】:1 V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 カンプト点滴静注:60mg /m ² Day1 Day8 Day15 生食【点滴】 (500mL):1本 Day1 Day8 Day15 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5% Δ 20mL) :8m L Day1 シスプラチン注:80mg /m ² Day1 生食【点滴】 (500mL):300m L Day1 フロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day8 Day15
MEC【肺NSCLC】CBDCA (6) 1+PTX (200) 1 q3w		1	20 生食 (100mL):1本 Day1 バクシタキセル注:200mg /m ² Day1 生食【点滴】 (500mL):1本 Day1 【バクシタキセル専用ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):6A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1

MEC【肺NSCLC】CBDCA (6) 1+PTX (200) 1+BV(15)1q3w		1	20	生食 (100mL):1本 Day1 アバスチン注:15m g /Kg Day1 バクタキセル注:200m g /m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 【バクタキセル専用ルート輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):6A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mq/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1
【肺NSCLC】BV(15)1 (維持療法) q3w		1	20	生食 (50mL):1本 Day1 アバスチン注:15m g /Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1
【肺NSCLC】DOC(60)1+ラムシルマブ(10)1 q3w		1	20	生食 (100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 サイラムザ点滴静注:10m g /Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付ルート輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 ドセタキセル点滴静注:60m g /m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 生食 (50mL):1本 Day1
【肺NSCLC】DOC(60)1 q3w		1	20	生食 (100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 ドセタキセル点滴静注:60m g /m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1
【肺NSCLC】GEM(1000)1.8.15 q4w		15	13	デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000m g /m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 Day15
【肺NSCLC】VNR(25)1.8 q3w		8	13	生食 (50mL):1本 Day1 Day8 ナベルピン注:25m g /m ² Day1 Day8 生食 (100mL):1本 Day1 Day8
MEC【肺NSCLC】CBDCA(5)1+VNR(25)1.8 q3w		8	13	パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 ナベルピン注:25m g /m ² Day1 Day8 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 カルボプラチン注:5AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 Day8

HEC SH【肺NSCLC+RT併用】CDDP(60)1+TS-1day1~14 q3w	【内服処方】S - 1 : day 1 ~ 1 4、デキサメタゾン 8mg : day 2 ~ 4	1	20	プロイメンド点滴静注用 (150mg)【冷】:1 V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5㏍#20mL) :8m L Day1 シスプラチン注:60m g /m Day1 生食〔点滴〕 (500mL):300m L Day1 プロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1A Day1 生食 (50mL):1本 Day1
【肺NSCLC】PEM(500)1+BV(15)1 q3w		1	20	デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 アリムタ注射用:500m g /m Day1 アバスチン注:15m g /Kg Day1
MEC【肺NSCLC】A [△] ム7 ^〇 〇 [△] マ ^〇 マ ^〇 +CBDCA+PEM q3w		1	20	生食 (50mL):1本 Day1 キートルーダ点滴静注:200m g Day1 【フィルタ付カート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 プロイメンド点滴静注用 (150mg):1 V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 アリムタ注射用:500m g /m Day1 生食 (100mL):1本 Day1 カルボプラチン注:5AUC/m Day1
MEC【肺SCLC】E療法 : CBDCA(5)1+VP-16(80)1.2.3 q3w		3	18	生食 (100mL):1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 カルボプラチン注:5AUC/m Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 エトボシド注「サト [△] 」 (100mg5mL):80m g /m Day1 Day2 Day3 生食〔点滴〕 (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day2 Day3
HEC SH【肺SCLC】PE療法CDDP(80)1+VP16(100)1.2.3q3w		3	18	ソルデム 3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 プロイメンド点滴静注用 (150mg)【冷】:1 V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 プロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 エトボシド注「サト [△] 」 (100mg5mL):100m g /m Day1 Day2 Day3 生食〔点滴〕 (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 シスプラチン注:80m g /m Day1 生食〔点滴〕 (500mL):300m L Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5㏍#20mL) :8m L Day1 生食 (100mL):1本 Day2 Day3 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day2 Day3

MEC【肺SCLC】AMR療法：AMR(45)1.2.3 q3w	ガイドラインでは40mg/m2	3	18	カルセド注射用:45mg g/m ² Day1 Day2 Day3 生食 (50mL):1本 Day1 Day2 Day3 生食 (100mL):1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注「 [®] ッグ」(1mg50mL)「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3
HEC SH【中皮腫】CDDP(75)1+PEM(500)1 q3w	【内服処方】デキサメタゾン8mg : day 2～4	1	20	プロイメンド点滴静注用 (150mg)【冷】:1V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 アリムタ注射用:500mg g/m ² Day1 生食 (100mL):1本 Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5 [®] 20mL) :8mL Day1 ソルデム3 A輸液 (500mL):1本 Day1 シスプラチン注:75mg g/m ² Day1 生食【点滴】(500mL):300mL Day1 プロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1A Day1 生食 (50mL):1本 Day1
限定 MEC【肺SCLC】CBDCA《6》1+PTX《200》1 q3w	※PTXは保険適応外 ガイドラインにも記載なし	1	20	生食 (100mL):1本 Day1 バクリタキセル注:200mg g/m ² Day1 生食【点滴】(500mL):1本 Day1 【 [®] 汎用ル-ト輸液セット (PVC [®] リ-) :1 S T Day1 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):6A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「ト-ワ」:1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1
MEC【肺SCLC】CPT-11(A法:100)1.8.15 q4w		15	13	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 Day15 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15 カンプト点滴静注:100mg g/m ² Day1 Day8 Day15 生食【点滴】(500mL):1本 Day1 Day8 Day15
限定【肺SCLC】VNR(25)1.8 q3w	※保険適応外	8	13	生食 (50mL):1本 Day1 Day8 ナベルピン注:25mg g/m ² Day1 Day8 生食 (100mL):1本 Day1 Day8
限定【肺SCLC】GEM(1000)1.8.15 q4w	※保険適応外	15	13	デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000mg g/m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 Day15
HEC SH【肺NSCLC】CDDP(75)1+PEM(500)1 q3w	【内服処方】デキサメタゾン8mg : day 2～4	1	20	プロイメンド点滴静注用 (150mg)【冷】:1V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 アリムタ注射用:500mg g/m ² Day1 生食 (100mL):1本 Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5 [®] 20mL) :8mL Day1 ソルデム3 A輸液 (500mL):1本 Day1 シスプラチン注:75mg g/m ² Day1 生食【点滴】(500mL):300mL Day1 プロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1A Day1 生食 (50mL):1本 Day1

HEC SH【肺NSCLC】CDDP(80)1+VNR(25)1.8 q3w	【内服処方】デキサメタゾン 8 mg : day 2 ~ 4 (※術後補助化学療法でも使用可)	8	13	<p>プロイメンド点滴静注用 (150mg)【冷】:1V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 ナベルピン注:25m g /m² Day1 Day8 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5%#20mL) :8m L Day1 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 シスプラチン注:80m g /m² Day1 生食【点滴】 (500mL):300m L Day1 フロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1A Day1 生食 (100mL):1本 Day8</p>	
MEC【肺NS+RT】{CBDCA(2)+PTX(40)}1.8.15.22.29.36q6w			36	6	<p>生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 カルボプラチン注:2AUC/m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 バクリタキセル注:40m g /m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 【パ】カクサキ専用ルート輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36</p>
【肺NSCLC】 \wedge Δ ∇ \square \circ (200mg/body)1+PEM(500)1q3w	\wedge Δ ∇ \square \circ +PEM+CDDP or CBDCA 4サイクル後の維持療法	1	20		<p>生食 (50mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 アリムタ注射用:500m g /m² Day1 キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 【フィルター付ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>
【肺NSCLC】デュルバルマブ(10)1 q2w	投与期間は12カ月間まで	1	13		<p>イミフィンジ点滴静注:10m g /Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【フィルター付ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 生食 (50mL):1本 Day1</p>
【肺NSCLC】nab-PTX(PTX : 100)1.8.15 q3w	アブラキサンは血液製剤の登録が必要です！！	15	6		<p>(毒)アブラキサン点滴静注 (100mg):100m g /m² Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 Day8 Day15</p>
MEC【肺SCLC+RT併用】CBDCA(6)1+VP-16(100)1.2.3 q3w	イメンド併用。	3	18		<p>生食 (100mL):1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注 (3.3mg1mL):1A Day1 Day2 Day3 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 エトボシド注「サト」 (100mg5mL):100m g /m² Day1 Day2 Day3 生食【点滴】 (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 カルボプラチン注:6AUC/m² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1</p>

HEC SH【肺NSCLC】ネツムマブ [®] 1.8+CDDP1+GEM1.8 q3w	最大6コースまで。その後、維持療法へ移行。【内服処方】デキサメタゾン 8 mg : day 2 ~ 4	8	13	<p>ソルデム 3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 プロイメント点滴静注用 (150mg)【冷】:1V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 フロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1A Day1 ◆ポーターザ点滴静注液 (800mg50mL) 【冷】:800mg Day1 Day8 生食 (200mL):1本 Day1 Day8 シスプラチン注:75mg /m² Day1 生食(点滴) (500mL):300m L Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5%)/20mL) :8m L Day1 ジェムザール注:1250mg /m² Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 生食 (100mL):1本 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day8</p>
【肺NSCLC】ネツムマブ [®] (800mg/body) 1.8 q3w	ネツムマブ [®] +CDDP+GEM最大6コース後の維持療法。	8	13	<p>生食 (50mL):1本 Day1 Day8 ◆ポーターザ点滴静注液 (800mg50mL) 【冷】:800mg Day1 Day8 生食 (200mL):1本 Day1 Day8 生食 (100mL):1本 Day1 Day8</p>
MEC【肺NSCLC】A [®] ムア [®] 01ス [®] マブ [®] +CBDCA+nab-PTX q3w	マブ [®] は血液製剤の登録が必要です！！	15	6	<p>(毒)◆アブラキサン点滴静注 (100mg):100mg /m² Day1 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 プロイメント点滴静注用 (150mg):1V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 キトルーダ点滴静注:200mg Day1 【フィルタ付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1S T Day1 カルボプラチン注:6AUC/m² Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day8 Day15 (毒)アブラキサン点滴静注 (100mg):100mg /m² Day8 Day15</p>
MEC【肺SCLC】テ [®] ム [®] ルマ [®] +CBDCA+VP-16 q3w(BW30kg超)	イメント併用。4サイクル終了後、維持療法へ移行。	3	18	<p>カルボプラチン注:6AUC/m² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 Day2 Day3 ◆エトボシド注(100mg5mL)「サド」:100mg /m² Day1 Day2 Day3 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 生食 (50mL):1本 Day1 イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 【フィルタ付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1S T Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):1A Day1 Day2 Day3</p>

HEC SH【肺SCLC】テ`ムルマ` + CDDP+VP16 q3w(BW30kg超)	day4にデキサメタゾン8mg/日内服。4サイクル終了後、維持療法へ移行。	3	18	<p>フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 プロイメンド点滴静注用 (150mg)【冷】:1V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5% 20mL) :8m L Day1 シスプラチン注:80m g /m Day1 生食(点滴) (500mL):300m L Day1 ◆エトボシド注(100mg5mL)「サト」:100m g /m Day1 Day2 Day3 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 パロノセトロン点滴静注/バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 生食 (100mL):1本 Day2 Day3 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day2 Day3</p>
【肺SCLC】テ`ムルマ` (1500mg/body)1 q4w(BW30kg超)	テ`ムルマ` + 白金系抗悪性腫瘍剤+VP-16 4サイクル後の維持療法。	1	27	<p>生食 (100mL):1本 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>
【肺NSCLC】ニボルマブ(480mg/body)1 q4w		1	27	<p>生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:480m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>
【中皮腫】ニボルマブ(480mg/body)1 q4w		1	27	<p>生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:480m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>
【中皮腫】ニボルマブ(360)1.22+化`リムマ` (1)1 q6w		22	20	<p>生食 (100mL):1本 Day1 Day22 生食 (50mL):1本 Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注用:1m g /Kg Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:360m g Day1 Day22 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day22</p>
MEC【肺NSCLC】CBDC(6)1+ nab-PTX(100)1.8.15 q3w	ア`ラキサンは血液製剤の登録が必要です！！	15	6	<p>デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロノセトロン点滴静注/バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 カルボプラチン注:6AUC/m Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 (毒)アプタキサン点滴静注 (100mg):100m g /m Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day8 Day15</p>

MEC【肺NSCLC】アテゾリスマブ+CBDCA+nab-PTX q3w	導入療法（4又は6サイクル）。アテゾリスマブは血液製剤の登録が必要です！！	15	カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 Day15 ◆デセントリク点滴静注(1200mg/20mL)【冷】:1200mg g Day1 生食 (250mL):1本 Day1 【フィルタ付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 6 デキサート注 (3.3mg/1mL):1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)【タイホウ】:1袋 Day1 プロイメド点滴静注用 (150mg):1V Day1 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 (毒)◆アブラキサン点滴静注 (100mg):100mg g/m ² Day1 デキサート注 (3.3mg/1mL):2A Day8 Day15 (毒)アブラキサン点滴静注 (100mg):100mg g/m ² Day8 Day15
【肺NSCLC】ラムシマブ(10)1+100720 連日 q2w		1	13 サイラムザ点滴静注:10m g/Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルタ付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 生食 (100mL):1本 Day1 生食 (50mL):1本 Day1
【肺NSCLC】ヘムプロシズマブ (400mg/body)1 q6w	化学療法未治療患者ではTPS≥50%、化学療法既治療患者ではTPS≥1%	1	41 生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL):400mg g Day1 【フィルタ付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
【肺NSCLC】アテゾリスマブ(1200mg/body)1 q3w		1	20 生食 (50mL):1本 Day1 ◆デセントリク点滴静注(1200mg/20mL)【冷】:1200mg g Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルタ付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 生食 (100mL):1本 Day1
【肺NSCLC】アテゾリスマブ(1200mg/body)1 q3w【Adj】	PD-L1陽性のNSCLCにおける術後補助療法。最大16回投与（投与期間は12ヵ月間まで）。	1	20 生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ◆デセントリク点滴静注(1200mg/20mL)【冷】:1200mg g Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルタ付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
【BS】MEC【NSCLC】CBDCA(6)1+PEM(500)1+BV(15)1 q3w		1	20 アリムタ注射用:500mg g/m ² Day1 生食 (100mL):1本 Day1 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg/1mL):3A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)【タイホウ】:1袋 Day1 ベバシズマブBS点滴静注:1.5mg g/Kg Day1
【BS】MEC【NSCLC】CBDCA(6)1+PTX (200) 1+BV(15)1q3w		1	20 生食 (100mL):1本 Day1 バクシケル注:200mg g/m ² Day1 生食【点滴】(500mL):1本 Day1 【バクシケル専用ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg/1mL):6A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)【トーワ】:1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)【タイホウ】:1袋 Day1 ベバシズマブBS点滴静注:1.5mg g/Kg Day1

【BS】MEC【NSCLC】アテゾリチン+CBDC+PTX+BV q3w	導入療法（4又は6サイクル）	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 ◆テセントリク点滴静注(1200mg20mL)【冷】:1200mg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 プロイメンド点滴静注用 (150mg):1V Day1 バクタキセル注:200mg g /m Day1 生食〔点滴〕 (500mL):1本 Day1 カルボプラチン注:6AUC/m Day1 生食 (100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トール」:1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 ヘパシズマブBS点滴静注:15m g /Kg Day1
【BS】【NSCLC】PEM(500)1+BV(15)1 q3w		1	20	デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 アリムタ注射用:500mg g /m Day1 ヘパシズマブBS点滴静注:15m g /Kg Day1
【BS】【NSCLC】アテゾリチン(1200)1+BV(15)1 q3w	維持療法	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 ◆テセントリク点滴静注(1200mg20mL)【冷】:1200mg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ヘパシズマブBS点滴静注:15m g /Kg Day1
【BS】【NSCLC】BV(15)1（維持療法） q3w		1	20	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ヘパシズマブBS点滴静注:15m g /Kg Day1
【肺NSCLC】ニホルマド(360)1.22+イトリムド(1)1 q6w	最長24ヵ月継続	22	20	生食 (100mL):1本 Day1 Day22 生食 (50mL):1本 Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注用:1m g /Kg Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:360mg g Day1 Day22 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day22
HEC SH【肺NSCLC】ニホルマド1+CDDP1+PEM1 q3w【NAC】	最大3サイクル	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 アロカリス点滴静注 (235mg10mL) 【冷】:1V Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5ℓ)20mL) :8m L Day1 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1A Day1 オプジーボ点滴静注:360mg g Day1 【フィルター付】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 アリムタ注射用:500mg g /m Day1 シスプラチン注:75m g /m Day1 生食〔点滴〕 (500mL):300m L Day1

MEC【肺NSCLC】ニボルマブ [®] 1+CBDCA1+PTX1 q3w【NAC】	最大3サイクル。【内服処方】アプレピタント併用。	1	20	生食 (100mL):1本 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 オブジーボ点滴静注:360m g Day1 【バ [®] カサキル専用ルート】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):6A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 バクリタキセル注:200m g /m Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 カルボプラチン注:6AUC/m Day1 生食 (250mL):1袋 Day1
MEC【肺NSCLC】durva+treme+CBDCA+PEM q3w (BW30kg超)	投与スケジュールは臨床試験や添付文書を参照。【内服処方】アプレピタント併用。	1	20	イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 イジド点滴静注:75m g Day1 【フィルター付ルート】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1 生食 (100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 アリムタ注射用:500m g /m Day1 カルボプラチン注:6AUC/m Day1
【肺NSCLC】テ [®] ニボルマブ [®] (1500mg/body)1 q4w(BW30kg超)	投与スケジュールは臨床試験や添付文書を参照。	1	27	生食 (50mL):1本 Day1 イミフィンジ点滴静注:1500m g Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付ルート】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1
【肺NSCLC】PEM(500)1 q3w		1	20	デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 アリムタ注射用:500m g /m Day1 【閉鎖式ルート】輸液セット (DEHP7リ) :1 S T Day1
MEC【肺NSCLC】CBDCA(5)1+PEM(500)1 q3w		1	20	生食 (100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 アリムタ注射用:500m g /m Day1 【閉鎖式ルート】輸液セット (DEHP7リ) :1 S T Day1 カルボプラチン注:5AUC/m Day1 生食 (250mL):1袋 Day1