

レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報
				薬品名：数量 投与日
HEC【尿路】CDDP(70)2+GEM(1000)1.8.15 q4w		15	13	デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 Day3 Day4 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day3 Day4 Day8 Day15 ジェムザール注:1000m g /m ³ Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 Day15 バロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day2 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day2 ソルデム 3 A 輸液 (500mL):1本 Day2 フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1 A Day2 生食 (50mL):1本 Day2 シスプラチン注:70m g /m ³ Day2 生食(点滴) (500mL):300m L Day2 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5%20mL) :8m L Day2 生食(点滴) (500mL):1本 Day2 Day3 Day4
HEC【尿路】CDDP(70)1+GEM(1000)1.8 q4w		8	20	シスプラチン注:70m g /m ³ Day1 生食(点滴) (500mL):300m L Day1 バロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 ソルデム 3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 ジェムザール注:1000m g /m ³ Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1 A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5%20mL) :8m L Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day2 Day3 Day8 生食 (100mL):1本 Day2 Day3 Day8
【前立腺】PSL(10)連日+DOC(75)1 q3w	※プレドニゾン 1回5mg 1日2回 連日内服 (デキサメタゾンで代替可)	1	20	生食 (100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 ドセタキセル点滴静注:75m g /m ³ Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1
MEC【尿路】CBDCA(4)1+GEM(1000)1.8 q4w		8	20	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 バロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 カルボプラチン注:4AUC/m ³ Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 ジェムザール注:1000m g /m ³ Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day8
【腎】ニボルマブ(240mg/body)1 q2w		1	13	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:240m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1

HEC【尿路】PTX(80)1.8+CDDP(70)2+GEM(1000)1.8		8	20	<p>デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 Day2 Day8 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1 A Day1 Day8 生食 (100mL):1本 Day1 Day3 Day4 Day8 バクリタキセル注:80mg /mL Day1 Day8 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 【ハ°カクセル専用ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 Day8 ジェムザール注:1000mg /mL Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5%20mL) :8m L Day2 ソルデム3 A 輸液 (500mL):1本 Day2 フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1 A Day2 生食 (50mL):1本 Day2 生食〔点滴〕 (500mL):1本 Day2 Day3 Day4 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day2 シスプラチン注:70mg /mL Day2 生食〔点滴〕 (500mL):300m L Day2 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day3 Day4</p>
【尿路】ベムプロリスマブ (200mg/body)1 q3w		1	20	<p>生食 (100mL):1本 Day1 生食 (50mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):200mg Day1 【フィルター付ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>
【前立腺】PSL(10)連日+カバジタキセル(25)1 q3w	※プレドニゾン 1回5mg 1日2回 朝・昼食後 連日内服	1	20	<p>生食 (100mL):1本 Day1 ◆ジエブタナ点滴静注(60mg1.5mL):25mg /mL Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1 A Day1 ボラミン注 (5mg1mL):1 A Day1 生食 (50mL):1本 Day1</p>
【腎】ハ°ム°リス°マブ° (200mg/body)1+アキシチニブ° q3w	アキシチニブ 5mg/回 1日2回 (10mg/回 1日2回まで増量可能)。	1	20	<p>生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):200mg Day1 【フィルター付ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>
【尿路】ベムプロリスマブ (400mg/body)1 q6w		1	41	<p>生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):400mg Day1 【フィルター付ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>
【腎】ニボルマブ(480mg/body)1 q4w		1	27	<p>生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:480mg Day1 【フィルター付ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1</p>

【尿路】アベルマブ (10)1 q2w	GEM+CDDP又はGEM+CBDCAの投与4-6サイクル後の維持療法。	1	13	生食 (100mL):1本 Day1 アセリオ静注液バッグ (1000mg100mL):0.5袋 Day1 パベンチオ点滴静注 (200mg10mL) 【冷】:10m g/Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
【腎】アベルマブ (10)1+アキシチニブ連日 q2w	アキシチニブ5mg/回 1日2回 (10mg/回 1日2回まで増量可能)。	1	13	生食 (100mL):1本 Day1 アセリオ静注液バッグ (1000mg100mL):0.5袋 Day1 パベンチオ点滴静注 (200mg10mL) 【冷】:10m g/Kg Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
【腎】ニボルマブ (240mg/body)1+カボザンチニブ連日 q2w	カボザンチニブ40mg/回 1日1回。	1	13	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:240m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
【腎】ニボルマブ (480mg/body)1+カボザンチニブ連日 q4w	カボザンチニブ40mg/回 1日1回。	1	27	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:480m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
【尿路】インヒルマブ ヘドチン(1.25)1.8.15 q4w	がん化学療法後に増悪した患者 (PD-1/PD-L1阻害剤による治療歴のある患者)	15	13	バドセブ点滴静注用 (30mg) 【冷】:1.25m g/Kg Day1 Day8 Day15 注射用水 (20mL):1本 Day1 Day8 Day15 生食 (50mL):1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15
【腎】ヘムプロリスマブ (200mg/body)1+レンバチニブ q3w	レンバチニブ 20mg/回 1日1回。ヘムプロリスマブは最大35サイクル。	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):200m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
【尿路】ニボルマブ(240mg/body)1 q2w	術後補助療法最大12カ月。CDDPを含む術前補助療法を受けた又はCDDPを含む術後補	1	13	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:240m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
【尿路】ニボルマブ(480mg/body)1 q4w	術後補助療法最大12カ月。CDDPを含む術前補助療法を受けた又はCDDPを含む術後補	1	27	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 【限定】オプジーボ点滴静注:480m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1
【腎】ヘムプロリスマブ (200mg/body)1 q3w【Adj】	ヘムプロリスマブの投与期間は12カ月間まで。	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):200m g Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 生食 (100mL):1本 Day1

【腎】ベムプロリスマブ (400mg/body)1 q6w【Adj】	ベムプロリスマブの投与期間は12か月間まで。	1	41	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):400mg Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1
【腎】ベムプロリスマブ (400mg/body)1+アチチニブ q6w	アチチニブ 5mg/回 1日2回 (10mg/回 1日2回まで増量可能)。	1	41	生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):400mg Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1
【前立腺】タカタミト連日 + DOC(75)1 q3w	タカタミト 600mg/回 1日2回。ADT併用下。PSL併用は医師判断。投与スケジュールは参照	1	20	デキサート注 (3.3mg1mL):2A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ドセタキセル点滴静注:75mg/m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 生食 (50mL):1本 Day1