

レジメン名	コメント	投与 休業		薬剤情報
		日数	期間	薬品名：数量 投与日
【卵巣】ドキシル：ADR(50)1 q4w		1	27	ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ドキシル注 (20mg10mL):50m g /m ² Day1 ブドウ糖注 (5%250mL):1本 Day1
MEC【卵巣】CBDCA(6)1+PTX(80)1.8.15 q3w		15	6	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80m g /m ² Day1 Day8 Day15 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 【ハ ^o クダセル専用ルート】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 Day8 Day15 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1 A Day1 Day8 Day15 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1
MEC【子宮】CBDCA(6)1+PTX(80)1.8.15 q3w		15	6	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80m g /m ² Day1 Day8 Day15 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 【ハ ^o クダセル専用ルート】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 Day8 Day15 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1 A Day1 Day8 Day15 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1
MEC【卵巣】CBDCA(6)1+PTX(175)1 q3w		1	20	生食 (100mL):1本 Day1 パクリタキセル注:175m g /m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 【ハ ^o クダセル専用ルート】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):6 A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1 A Day1 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1
MEC【子宮】CBDCA(6)1+PTX(175)1 q3w		1	20	生食 (100mL):1本 Day1 パクリタキセル注:175m g /m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 【ハ ^o クダセル専用ルート】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):6 A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1 A Day1 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1

MEC【子宮】IFM(1500)1~5 q3w		5	16	生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メイロン注 (7%20mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ウロミテキサン注 (400mg4mL):360m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食 (100mL):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 ◆イホマイド注 (1g):1500m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 【閉鎖式ルート】輸液セット (DEHPフリー) :1 S T Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
MEC【卵巣】CBDCA(6)1+PTX(175)1+BV(15)1 q3w	(手術後28日以内に開始の場合) アバスチンは2クール目以降に	1	20	生食 (100mL):1本 Day1 アバスチン注:15m g /Kg Day1 パクリタキセル注:175m g /m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 【パクリタキセル専用ルート】輸液セット (PVCフリー) :1 S T Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):6 A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1
【卵巣】BV(15)1 (維持療法) q3w	維持療法に使用	1	20	生食 (50mL):1本 Day1 アバスチン注:15m g /Kg Day1 生食 (100mL):1本 Day1
【卵巣】GEM(1000)1.8.15 q4w		15	13	デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000m g /m ² Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 Day15
MEC【卵巣】CPT-11(A法:100)1.8.15 q4w		15	13	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 カンプト点滴静注:100m g /m ² Day1 Day8 Day15 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 Day8 Day15 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15
【絨毛性疾患】《筋肉注射》MTX(50mg/m ²)1 q1w		1	6	[要予約]◆【腎】メソトレキセート注 (50mg):50m g /m ² Day1 注射用水 (20mL):1本 Day1
【卵巣】PLD(40)1+BV (10) 1.15 q4w		15	13	アバスチン注:10m g /Kg Day1 Day15 生食 (100mL):1本 Day1 Day15 ドキシル注 (20mg10mL):40m g /m ² Day1 ブドウ糖注 (5%250mL):1本 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 生食 (50mL):1本 Day15
限定【卵巣】GEM(1000)1.8+BV (15) 1 q3w		8	13	デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 Day8 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 アバスチン注:15m g /Kg Day1 ジェムザール注:1000m g /m ² Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8

MEC【子宮体】ADR(60)1 q3w	CDDP+ADRレジメン使用後に限る。ADRの累積投与量は500mg/m ² まで。	1	20	ドキシルピシン塩酸塩注:60mg/m ² Day1 生食(100mL):1本 Day1 デキサート注(3.3mg1mL):3A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ(1mg50mL)「HK」:1袋 Day1
MEC【卵巣】PTX(175)1+CDGP(80)1 q4w		1	27	パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 生食(点滴)(500mL):1本 Day1 【パクリタキセル専用ルート】輸液セット(PVCフリー):1S T Day1 フロセミド注(20mg2mL)「NIG」:1A Day1 アクブラ静注用:80mg/m ² Day1 デキサート注(3.3mg1mL):6A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トーフ」:1A Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ(1mg50mL)「HK」:1袋 Day1
MEC 限定【卵巣】CBDCA(6)1+DOC(75)1+Bv(15)1 q3w	イマト®併用。手術後28日以内に開始の場合Bvは2サイクル目以降。	1	20	デキサート注(3.3mg1mL):1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 アバスチン注:15mg/Kg Day1 生食(100mL):1本 Day1 ドセタキセル点滴静注:75mg/m ² Day1 生食(点滴)(500mL):1本 Day1 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 生食(250mL):1袋 Day1
【子宮体】レボプロリスマブ(200mg/body)1+レバチニブ q3w	レバチニブ 20mg/回 1日1回。レムプロリスマブは最大35サイクル。	1	20	生食(50mL):1本 Day1 生食(100mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):200mg Day1 【フィルター付ルート】輸液セット(PVCフリー):1S T Day1
MEC【卵巣】CBDCA(5)1+PLD(30)1+Bv(10)1.15 q4w	アプレピタント併用。最大6コースまで。その後、レバチニブ維持療法へ移行。	15	13	デキサート注(3.3mg1mL):1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 アバスチン注:10mg/Kg Day1 Day15 生食(100mL):1本 Day1 Day15 ブドウ糖注(5%50mL):1本 Day1 ドキシル注(20mg10mL):30mg/m ² Day1 ブドウ糖注(5%250mL):1本 Day1 カルボプラチン注:5AUC/m ² Day1 ブドウ糖注(5%100mL):1本 Day1 生食(50mL):1本 Day15
【子宮頸】レムプロリスマブ(200mg/body)1 q3w	維持療法。レムプロリスマブ最大35サイクル。	1	20	生食(50mL):1本 Day1 生食(100mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):200mg Day1 【フィルター付ルート】輸液セット(PVCフリー):1S T Day1