

レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報
				薬品名：数量 投与日
【心嚢内投与】CDDP(20mg/body)1		1	0	シスプラチン注:20m g Day1
限定【平滑筋肉腫】GEM(1000)1.8+DOC(75)8 q3w		8	13	デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 Day8 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 ジェムザール注:1000m g/m ² Day1 Day8 ブドウ糖注 (5%100mL):1本 Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注:75m g/m ² Day8 生食(点滴) (500mL):1本 Day8
【血管肉腫】weeklyPTX(100)1.8.15 q4w		15	13	生食 (100mL):1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 Day8 Day15 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1 A Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:100m g/m ² Day1 Day8 Day15 生食 (250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 【パクリタキセル専用ル-ト】輸液セット (PVC7リ-) :1 S T Day1 Day8 Day15
MEC 限定【腺様嚢胞癌】CBDCA(6)1+PTX(200)1 q3w		1	20	生食 (100mL):1本 Day1 パクリタキセル注:200m g/m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 【パクリタキセル専用ル-ト】輸液セット (PVC7リ-) :1 S T Day1 カルボプラチン注:6AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):6 A Day1 【腎】ファモチジン注射液(20mg)「トロー」:1 A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1
MEC【軟部肉腫】ヨンドリス(1.2) q3w		2	19	デキサート注 (3.3mg1mL):6 A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 ヨンドリス点滴静注用:1.2m g/m ² Day1 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day2
【胸腔内投与】CDDP(100mg/body)1 q1w		1	6	シスプラチン注:100m g Day1 生食(点滴) (500mL):200m L Day1
【心嚢内投与】BLM(15mg/body)1		1	0	[要予約]◆【腎】プレオ注 (15mg):15m g Day1 生食NS (20mL):1本 Day1
【軟部肉腫】ハラヴェン(1.4)1.8 q3w		8	13	デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day1 Day8 生食 (100mL):1本 Day1 Day8 ハラヴェン静注 (1mg2mL):1.4m g/m ² Day1 Day8 生食 (50mL):1本 Day1 Day8

HEC SH【神経内分泌】CDDP1+CPT-11 1.8.15q4w	【内服処方】デキサメタゾン 8 mg : day 2~4、9~10、16~17	15	シスプラチン注:60mg/m ² Day1 生食(点滴) (500mL):300m L Day1 プロイメント点滴静注用 (150mg)【冷】:1V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 カンプト点滴静注:60mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day8 Day15 13 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5E#20mL) :8m L Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 プロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 Day8 Day15 生食 (100mL):1本 Day8 Day15
HEC SH【神経内分泌】CDDP(80)1+VP16(100)1.2.3q3w		3	18 ソルデム 3 A 輸液 (500mL):1本 Day1 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 プロイメント点滴静注用 (150mg)【冷】:1V Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 プロセミド注(20mg2mL) 「NIG」:1A Day1 生食 (50mL):1本 Day1 エトボシド注「サト」 (100mg5mL):100mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生食(点滴) (500mL):300m L Day1 硫酸マグネシウム補正液1mEq/mL (0.5E#20mL) :8m L Day1 生食 (100mL):1本 Day2 Day3 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day2 Day3
MEC【神経内分泌】CBDCA(5)1+VP-16(80)1.2.3 q3w		3	18 デキサート注 (3.3mg1mL):3 A Day1 パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL)「タイホウ」:1袋 Day1 エトボシド注「サト」 (100mg5mL):80mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食(点滴) (500mL):1本 Day1 Day2 Day3 カルボプラチン注:5AUC/m ² Day1 生食 (250mL):1袋 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注 (3.3mg1mL):2 A Day2 Day3
【固形MSI】ベムプロリズマブ (200mg/body)1 q3w	がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Hを有する固形癌 (標準的な治療が困難な)	1	20 生食 (50mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):200mg Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1 生食 (100mL):1本 Day1
【固形MSI】ベムプロリズマブ (400mg/body)1 q6w	がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Hを有する固形癌 (標準的な治療が困難な)	1	41 生食 (50mL):1本 Day1 生食 (100mL):1本 Day1 ◆キイトルーダ点滴静注(100mg4mL):400mg Day1 【フィルター付ルト】輸液セット (PVC7リ) :1 S T Day1